



2

ยาเสพติด

อันตราย

กัญชา



ออกฤทธิ์ผสมผสาน ทั้งกระตุ้น กด และหลอน
 ประสาท แรกเสพทำให้ช่างพูด หัวเราะ ร่าเริง
 ต่อมาจะมีอาการคล้ายคนเมา เชื่องซึม ถ้าเสพมาก
 จะหลอนประสาท เห็นภาพลวงตา ควบคุมตนเองไม่ได้

โทษ ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 ติดเชื้อโรคได้ง่าย สมองมีนชา ความจำเสื่อม ทำให้
 ความรู้สึกทางเพศลดลงหรือหมดไป มีโอกาส
 เป็นโรคมะเร็งปอดได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ถึง 5 เท่า

ฝิ่น



ออกฤทธิ์กดประสาท ผู้เสพจะมีอาการ
 จิตใจเลื่องลอย ง่วงซึม พูดจาจวน ความคิด
 เชื่องช้า เป็นที่มาของยาเสพติดร้ายแรง คือ
 มอร์ฟีน และเฮโรอีน

โทษ ทำให้อวัยวะชบุชิต ผอม ตัวเหลือง
 สมองเสื่อม หากเสพเกินขนาด
 อาจถึงแก่ความตายได้

เฮโรอีน (ผงขาว)



ออกฤทธิ์กดประสาทเป็นยาเสพติดร้ายแรง
 เสพเพียงเล็กน้อยก็ติดได้ ออกฤทธิ์แรงกว่าฝิ่น
 ผู้เสพจะเกิดอาการมึนงง เชื่องซึม เคลิบเคลิ้ม
 บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน

โทษ ร่างกายจะทรุดโทรม ขาดภูมิคุ้มกัน ผอม ตัวชืดเหลือง
 ขอบตาคล้ำ สมองและประสาทเสื่อม
 หากขาดยาหรือลงแดงจะทุกข์ทรมาน
 เจ็บปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ
 หากใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น
 อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

สารระเหย



ออกฤทธิ์กดประสาท ผู้เสพจะเคลิบเคลิ้ม คล้ายมีนเมา
 พูดจาอ้อแอ้ หูแว่ว หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

โทษ ทำลายระบบประสาทและอวัยวะในร่างกายน
 ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งในเม็ดเลือดขาว
 ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลีบ จนถึงขั้นเป็นอัมพาต
 และสมองฝ่อถาวร ไม่สามารถรักษาให้หายได้



ชุดนิทรรศการ “ยาเสพติด ภัยพิบัติร้าย ทำลายชีวิต”

สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. โทรศัพท์ : 0-22470901-19 www.oncb.go.th

ปีที่พิมพ์ 2555 หมายเลขเอกสารเผยแพร่ 1-09-2555

