



คู่มือความรู้
สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง
“โรคพิษสุนัขบ้า
และโรคระหว่างสัตว์และคน”



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เจษฎา	โชคดำรงสุข	อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัมรินทร์	รวยอาจิณ	รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์รุ่งเรือง	กิจผาติ	ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป
นายแพทย์วิชาญ	ปาววัน	ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

ผู้จัดทำ

ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นายอานุภาพ พงษ์พานิช	สำนักโรคติดต่อทั่วไป
นางสาวกมลวรรณ กลีบโกมุท	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

จัดพิมพ์โดย	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
พิมพ์ที่	ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวน	101,500 เล่ม
ปีที่พิมพ์	2560
ISBN	978-616-11-3362-7



คำนำ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการเสียชีวิตทุกราย ปัจจุบันทั่วโลกยังมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละ 55,000 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทวีปแอฟริกาและเอเชีย สาเหตุมาจากการไม่ได้ควบคุมโรคในสุนัข และผู้เสียชีวิตไม่ได้เข้ารับการรักษาลงสัมผัสโรค องค์การอนามัยโลกและองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ได้ให้ความสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งประเทศทั่วโลกมากกว่า 150 ประเทศได้เข้าร่วมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก สำหรับประเทศไทยได้ร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่จะกำจัดโรคนี้นี้ให้หมดไป ภายในปี พ.ศ. 2563

ประเทศไทยยังมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ทุกปี ซึ่งการผลิตและพัฒนาคู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน” จะมีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า คือ การสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงเพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เกิดความตระหนัก ปฏิบัติตนให้มีพฤติกรรมเสี่ยงสุนัขที่ถูกต้อง กระตุ้นประชาชนให้ความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด และปฏิบัติตนหลังถูกสัตว์กัดได้ถูกต้อง ลดการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป



นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค
มิถุนายน 2560



ท่านคิดว่าในภาพนอกจากคนแล้วสัตว์ชนิดใด
ป่วยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บ้าง

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?

โรคพิษสุนัขบ้า หรือ โรคกลัวน้ำ เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส เป็นไปได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น ชะนี กระรอก กระแต กระต่าย หรือแม้กระทั่งสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย แพะ เป็นต้น แต่พบมากที่สุดในส่วน สุนัข มากถึงร้อยละ 95 และ รองลงมาคือ แมว



สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทยเป็นอย่างไร

ในแต่ละปีคนไทยถูกสุนัขกัดไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2552 - 2559) พบผู้เสียชีวิต ปีละ 5 - 24 ราย

ปีที่พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด คือ พ.ศ. 2552 จำนวน 24 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 55 - 64 ปี, อายุมากกว่า 65 ปี และ 35 - 44 ปี

อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง **รองลงมา** คือ ไม่ทราบอาชีพ / ในปกครอง และเกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังถูกสุนัขกัด



แม้ว่าจากรายงานจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง แต่พบว่า
ในหลายจังหวัดมีรายงานผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เช่น กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี ปราจีนบุรี สงขลา เป็นต้น

ดังนั้น การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด
ช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ เพราะโรคนี้
ไม่มีทางรักษาให้หายได้ หากติดเชื้อและมีอาการแล้วเสียชีวิต
ทุกราย



คนเราได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างไร

คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากการถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน โดยเชื้อจะถูกขับออกมาพร้อมกับน้ำลายของสัตว์นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขและแมว สามารถตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในน้ำลายได้ 1 - 7 วัน ก่อนแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า



อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีอะไรบ้าง

สุนัขและแมวจะแสดงอาการหลังจากถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน ประมาณ 3 - 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 6 เดือน และจะตายภายใน 10 วัน หลังจากแสดงอาการ ซึ่งอาการป่วยจะมีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม



อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก

มีอาการประมาณ 2 - 3 วัน
สุนัข/แมวจะมีอารมณ์และนิสัย
เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สุนัข
ที่ชอบคลุกคลีกับเจ้าของ จะปลีก
ตัวออกไปหลบอยู่เงียบๆ และ
มีอาการหงุดหงิด เป็นต้น



ระยะที่ 2 ระยะตื่นเต้น

เริ่มมีอาการทางประสาท
สุนัข/แมวจะกระวนกระวาย
ตื่นเต้นหงุดหงิด ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะ
สิ่งของไม่เลือก ม่านตาขยายกว้าง
ถ้ากักขังหรือล่ามโซ่ไว้จะกัดกรง
หรือโซ่จนเลือดกลบปาก โดย
ไม่เจ็บปวด เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป
ตัวแข็ง บางตัวล้มลงชักกระตุก



ระยะที่ 3 อาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ระยะอัมพาตสุนัข/แมวจะมีการค้างห้อยตกลง มีสีแแดงคล้ำห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล ขย้อนอาหารคล้ายมีอะไรอยู่ในลำคอ ขาอ่อนเปลี้ย ทรงตัวไม่ได้ ล้มลงอัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



การเจ็บป่วยในคนหลังถูกสัตว์ มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดข่วน

หลังถูกสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดหรือข่วน
ประมาณ 3 สัปดาห์ ถึง 6 เดือน ก็จะปรากฏอาการป่วย
แต่บางคนระยะฟักตัวอาจสั้นมากคือไม่ถึงสัปดาห์ หรือ
อาจนานเกิน 1 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

1. จำนวนเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่เข้าไปในร่างกาย
ซึ่งบาดแผลที่ถูกกัดมีขนาดใหญ่ ลึกหรือมีบาดแผล
หลายแห่ง จะมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้มาก



2. ตำแหน่งที่ถูกกัดหรือตำแหน่ง
ที่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกาย เช่น
ถ้าบาดแผลอยู่ใกล้สมองมาก เชื้อโรคก็จะ
เดินทางไปถึงสมองได้เร็ว หรือ อยู่ในบริเวณที่
มีปลายประสาทมาก เช่น มือหรือเท้า เชื้อโรค
ก็จะเข้าสู่ระบบประสาทได้ง่าย



3. อายุของคนที่ถูกสุนัขกัดหรือข่วน
เช่น เด็กและผู้สูงอายุจะมีความต้านทานต่อ
โรคพิษสุนัขบ้าต่ำกว่าคนหนุ่มสาว




4. สายพันธุ์ของเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
ถ้าเป็นสายพันธุ์จากสัตว์ป่า จะมีอาการรุนแรงกว่า
สายพันธุ์จากสัตว์เลี้ยง



อาการป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่พบในคน

เริ่มแรก คือ เมื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคันรุนแรงบริเวณที่ถูกกัด แล้วอาการคันลามไปส่วนอื่น


ต่อมา จะมีอาการกระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ กลืนลำบาก โดยเฉพาะของเหลว กลัวน้ำ ปวดท้องน้อยและกล้ามเนื้อขากระตุก แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก หรืออาจชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด



จะรู้ได้อย่างไรว่าสุนัขหรือสัตว์ที่กัด/ข่วน ไม่ใช่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ต้องมีปัจจัยสนับสนุนครบทั้ง 5 ข้อ คือ

1. สุนัขหรือสัตว์นั้นได้รับการ**ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี** เคยฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งสุดท้ายไม่เกิน 1 ปี
2. สุนัขหรือสัตว์นั้น**ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี** อยู่ในบริเวณรั้วรอบขอบชิด มีโอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย



3. สุนัขหรือสัตว์นั้น**มีอาการปกติ** ยังกินน้ำกินอาหารได้
4. การถูกสุนัขหรือสัตว์นั้นกัดหรือทำร้าย**มีเหตุโน้มนำ**
เช่น ไปแหย่หรือทำให้สุนัขโกรธ ตกใจ หรือสุนัขหรือสัตว์นั้น
ชอบกัดคนเป็นประจำ
5. **สามารถกักขังสุนัขหรือสัตว์นั้นไว้ดูอาการได้**
ถ้าภายใน 10 วัน สุนัขยังคงมีอาการปกติ ถือว่าสุนัขไม่ป่วยด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า

กรณีที่สุนัขหรือสัตว์นั้นกัดหรือข่วนแล้วหนีหายไป
ไม่สามารถติดตามดูอาการได้ ไม่ปรากฏเจ้าของ ไม่ทราบ
ประวัติที่แน่นอน ให้ถือเสมือนว่าสุนัขหรือสัตว์นั้นมี
เชื้อโรคพิษสุนัขบ้า



การป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

1. การป้องกันไม่ให้สัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ได้แก่


1.1 ร่วมมือกันทำให้สุนัข แมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ถ้าเก็บหรือซื้อลูกสุนัขหรือลูกแมวมาเลี้ยง ต้องปรึกษาสัตวแพทย์เพราะอาจมีเชื้อพิษสุนัขบ้า

ดังนั้น ต้องรีบนำไปฉีดวัคซีน ตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 กำหนดให้เจ้าของสุนัข ต้องนำสุนัขมารับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ 2 - 4 เดือน แล้วฉีดกระตุ้นอีกครั้งตามกำหนดนัดและฉีดซ้ำทุกปี



**1.2 ต้องช่วยกันลดจำนวน
สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ** หรือสุนัขที่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ โดยหาวิธีคุมกำเนิด
สุนัขเหล่านั้น และต่อต้านผู้นำสุนัข
ไปปล่อยทิ้งตามสถานที่ต่างๆ เช่น
วัด โรงเรียน ตลาด เป็นต้น



**1.3 เลี้ยงสุนัข แมว
ต้องไม่ปล่อยออกนอกบ้านตามลำพัง**
เพราะจะทำให้ลดโอกาสที่สุนัขจะไป
สัมผัสกับสุนัขบ้า และต้องดูแล
ไม่ให้ไปทำความเดือดร้อนหรือ
ก่ออันตรายหรือสร้างความรำคาญ
แก่ผู้อื่น



1.4 พบเห็นสัตว์สงสัยเป็นโรค
พิษสุนัขบ้า ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทันที หรือช่วยกันจับ โดยระวัง
อย่าให้ถูกกัด แล้วนำหัว / ตัวสัตว์
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ



1.5 ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยง



2. ลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัข แมว หรือ สัตว์อื่นกัด หรือข่วนเจ้าของสัตว์ต้องดูแลสุนัข แมว หรือสัตว์อื่น อย่างถูกต้อง

2.1 ไม่ให้กัดคน เลี้ยงให้มีนิสัยดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เลี้ยงแล้วมีความสุข ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์

2.2 การดูแลระมัดระวังคนไม่ให้ถูกสุนัข แมว หรือสัตว์อื่น กัดหรือข่วน ได้แก่ อย่าปล่อยให้เด็กเล่นอยู่ตามลำพัง สอนให้เด็ก ระมัดระวัง เมื่อเล่นหรือใกล้สุนัข การป้องกันไม่ให้สุนัขกัด หรือ ทำร้าย โดยใช้คาถา 5 ย ได้แก่

ย ที่ 1 คือ อย่าแหย่

ให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ โกรธ



ย ที่ 2 คือ อย่าเหยียบ

หาง หัว ตัว ขา หรือ ทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ



19

คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน”

ย ที่ 3 คือ อย่าแยก

สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่กำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่า



ย ที่ 4 คือ อย่าหยิบ

จานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ
กำลังกินอาหาร



21

คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน”

ย ที่ 5 คือ อย่างง

หรือ เข้าใกล้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



22


คู่มือความรู้สำหรับนักเรียนและประชาชน
เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคระหว่างสัตว์และคน”

การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เมื่อถูกสุนัขกัด ต้องทำดังนี้

1. ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่หลายๆ ครั้ง
ให้ถึงก้นแผล ล้างสบู่ออกให้หมด
2. เช็ดแผลให้แห้ง **ใส่ยารักษาแผลสด**
3. จดจำสัตว์ที่กัดให้ได้ เพื่อสืบหาเจ้าของ
เพื่อ **กักสัตว์ไว้ดูอาการ 10 วัน** สอบถามประวัติการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
4. **ไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข**
เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ที่ถูกต้อง

**“เมื่อสุนัขกัดต้องล้างแผล
ใส่ยา กักหมา หามอ”**





คำแนะนำสำหรับเด็กๆ ที่จะเลี้ยงสุนัข แมว

คำแนะนำสำหรับเด็กๆ ที่จะเลี้ยงสุนัข แมว หรือจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากการถูกสัตว์ทำร้าย และการติดเชื้อ เด็กๆ ควรปฏิบัติ ดังนี้

1. **ต้องปรึกษาคุณพ่อคุณแม่** หรือ ผู้ปกครองก่อนว่าจะเลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่
2. **นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี** ปีแรก ควรฉีด 2 ครั้ง



3. ไม่ปล่อยสุนัขพ่นพ่ายในที่สาธารณะทุกครั้งที่น่าสุนัข ออกนอกบ้านต้องอยู่ในสายจูง ไม่นำสุนัขไปปล่อยและ ต้องคุมกำเนิดไม่ให้มีสุนัขมากเกินไป


4. ในกรณีที่จะเล่นกับสัตว์เลี้ยงต้อง**อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง**เท่านั้น ห้ามเล่นกับสัตว์เลี้ยงโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล และต้องล้างมือทุกครั้ง หลังสัมผัสกับสัตว์เลี้ยง

5. **ต้องจำไว้เสมอ**ว่าเวลาเล่นกับสัตว์เช่นสุนัข **อย่า**เหยยให้ สัตว์โมโห **อย่า**เหยียบหางหัวตัวหรือขาหรืออย่าทำให้สัตว์ตกใจ **อย่า**แยกสัตว์ที่กำลังกัดกัน **อย่า**หยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้าย อาหารขณะสุนัขกำลังกินอาหาร **อย่า**ยุ่งหรือเข้าไปใกล้สัตว์ ที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ



6. **ถ้าถูกสัตว์เลื้อยทำร้าย** หรือเกิดบาดแผลจากการเล่นกับสัตว์เลื้อย ต้องรีบล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ เช็ดแผลให้แห้ง ใส่ยารักษาแผลสด หรือไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

7. **ห้ามไปคลุกคลี หรือสัมผัสกับสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลื้อย** ของที่บ้าน เพราะเราไม่สามารถมั่นใจในความปลอดภัยทั้งจากโรคและการทำร้ายได้



โรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน ที่เด็ก ๆ ต้องรู้




คนเราติดเชื้อโรคอื่นๆ
จากการกินอาหารร่วมกับสุนัข
หรือแมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ได้
จากการใช้จาน ชาม ช้อน สำหรับคนมาใช้กับสัตว์
หรือ การกินอาหารเครื่องดื่มร่วมกันในภาชนะเดียวกัน
หรือแม้แต่การพาสัตว์เลี้ยงเข้าไปในร้านสะดวกซื้อแล้วนำไป
เกาะตู้กดน้ำแข็งบ้าง แอบเอาไปใส่ในตู้แช่น้ำดื่มบ้าง ทำให้
ติดเชื้อโรคได้

เพราะทั้งสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ อาจจะมีเชื้อ
สเตรปโตคอคคัส และสแตปฟีโลคอคคิ (Streptococcus and
Staphylococci) ที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง การติดเชื้อมีผิวหนัง
รวมถึงมีไข้ ปลายนิ้วอักเสบ พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย

นอกจากนี้ยังมี **“โปรโตซัว”** ซึ่งสามารถก่อโรคท้องร่วง
ทั้งในคนและสุนัข แมว

อย่างที่เราบ่อย ๆ คือเชื้อกลุ่ม **“จีเียร์เดีย”** (Giardia) รวมถึง
เชื้อซาโมโนเลาที่ก่อโรคท้องร่วงทั้งคนทั้งสัตว์



เชื้อกโซพลาสโมซิส (Toxoplasmosis)

มีอยู่ในสัตว์หลายๆ ประเภท แต่ที่ปัญหา คือ “แมว” เป็นสัตว์พิเศษที่สามารถนำไข่ของเชื้อนี้สู่คนได้ โดยเฉพาะ “หญิงตั้งครรภ์” เมื่อรับเชื้อเข้าไปอาจทำให้แท้งได้ รวมถึงอาจทำให้ ทารกในครรภ์มีการเจริญเติบโตผิดปกติ ในต่างประเทศจะเข้มงวดเรื่องนี้มาก ขณะที่ประเทศไทยยังไม่ค่อยมีรายงานมากนัก แต่ก็มี การตรวจพบเชื้อดังกล่าวเช่นกัน



อีกโรคหนึ่งที่เราได้คือ “โรคแมวข่วน” (Cat Scratch Fever) เนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่ชอบเลียสิ่งต่าง ๆ รวมถึงเล็บของตัวเอง ทำให้ที่เล็บมีแบคทีเรียเยอะ ประกอบกับการที่เป็นสัตว์ที่ชอบข่วน

ดังนั้นคนที่ถูกข่วนอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนัง ยิ่งถ้าเจอเชื้อ **บาโทไนโลซิส** (Bartonellosis) อาจจะ ทำให้อาการรุนแรงได้ นอกจากนี้ยังมี **เชื้อราริงเวอร์ม** (Ringworm) ก่อโรคผิวหนังคล้ายกับกลากเกลื้อน คนที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้สูงอายุ เด็ก คนป่วยหรือรับยากลุ่มสเตียรอยด์อยู่เสี่ยงติดเชื้อง่าย

นอกจากนี้ ยังมีโรคภูมิแพ้ขนสุนัข ขนแมว หรือโรคจาก เห็บ หมัด ที่ต้องระมัดระวัง

