

12

ภาชนะแหล่งกำเนิด ยุงลาย



ข้อมูลสถิติภาชนะขังน้ำที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายบ่อยที่สุดในประเทศไทย ปี 2019



53.32%

น้ำใช้



10.69%

ภาชนะทั่วไป



10.09%

ภาชนะที่ไม่ใช้



6.32%

ยางรถยนต์เก่า



3.86%

แจกัน



2.86%

อ่างบัว/ไม้ น้ำ



2.84%

น้ำเลี้ยงสัตว์



2.72%

น้ำดื่ม



2.28%

ที่รองกันมด



2.25%

จานรองกระถางต้นไม้



1.88%

ที่รองน้ำตู้เย็น





0.90%

กาบใบพืช



ข้อมูลจากระบบกันระบาด (www.tanrabad.org)



6 แหล่งยออดฮิต ยุงลายชอบวางไข่





1 ปิดฝา
ภาชนะเก็บน้ำ
ให้มิดชิด

2

เปลี่ยนน้ำ
ในแจกัน
ทุก 7 วัน



3



นอนกางมุ้ง

**สารพัดเคล็ดลับ
รับมือกับยุงลาย**



4

อย่าให้ยุงกัด
สวมเสื้อผาให้มิดชิด
ใช้โลชั่นทาตัว
จุดยากันยุง
ฉีดสเปรย์กำจัดยุง



5



คว่ำภาชนะ
และสิ่งของ
ที่มีน้ำขัง

6



ปล่อยปลา
หางนกยูง
ในอ่างบัว

7



ใช้ทราย
กำจัด
ลูกน้ำยุงลาย

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
รอบบริเวณบ้าน



8

ปฏิบัติทุกข้ออย่าง
สม่ำเสมอ



9

ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย **คากา 5 ป.**



โรคไข้เลือดออก เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิด เป็นแล้ว เป็นได้อีก



กำจัดลูกน้ำ ยุงลาย และแหล่งเพาะพันธุ์
ทำได้ด้วยมือคุณ



1 ปิด

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำ
ให้มิดชิด



2

ปล่อย

ปล่อยปลาในลูกน้ำ



3

เปลี่ยน

เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน



5

ปฏิบัติ

ปฏิบัติ
เป็นประจำ



4

ปรับ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม



สายด่วน
กระทรวงมหาดไทย
1422

“ก้าวสู่สังคมไทย ไม่ป่วยตายด้วยไข้เลือดออก”
Moving Forward to Zero Dengue Death

3 เก็บ 3 โรค

ป้องกันได้ถึง 3 โรค

● โรคไข้เลือดออก ● โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ● โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



เก็บบ้าน

ให้สะอาดปลอดโปร่ง
ไม่ให้มีมุมอับทึบ
เป็นที่เกาะพักของยุง



เก็บขยะ

กำจัดเศษขยะต่าง ๆ
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง



เก็บน้ำ

ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด
ป้องกันยุงลายวางไข่
และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด
โดยทายากันยุง และนอนในมุ้ง




3 เก็บ 3 โรค

ป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

3 เก็บ



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ
ที่อาจเป็นแหล่งน้ำขัง
ให้ยุงลายวางไข่ได้



เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
ภาชนะที่ปิดไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้ง
หรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ

ถ้าไม่ยากโดนยุงกัด ต้องป้องกันไม่ให้ยุงเกิด



8 วิธี กำจัดแหล่งวางไข่ยุง ทำง่ายๆ เริ่มต้นได้ ที่ตัวคุณ



01

เปลี่ยนถ่ายน้ำ
ทุกสัปดาห์




05

ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ



02

ขัดขอบภาชนะ
หลังเทน้ำทิ้ง



06

ปิดภาชนะให้สนิท



03

เปลี่ยนน้ำใน
ภาชนะที่ปิดไม่ได้



07

ปล่อยปลากินลูกน้ำ



04

จัดการภาชนะ
ไม่ให้มีน้ำขัง



08

ทำเป็นประจำ
ทุก 7 วัน

ยุงลาย เป็นพาหะของโรค



- โรคไข้เลือดออก



- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



- โรคไข้ปวดข้อยุงลาย



ถ้าไม่อยากโดนยุงกัด ต้องป้องกันไม่ให้ยุงเกิด





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ขัดขอบถัง

ป้องกันยุงเกิด



รู้ทัน โรคแมลง

ไข่ยุงในขอบถัง สามารถอยู่ได้
นานเป็นปี ถึงแม้จะไม่มีน้ำ
นอกจากเปลี่ยนน้ำทุก 7 วันแล้ว
อย่าลืมขัดขอบถังด้วยนะ


รวมพลัง ป้องกันไข้เลือดออก



Go!!!

เก็บ

เก็บบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง
ไม่ให้ยุงเกาะพัก



ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ภาชนะที่ปิดไม่ได้
ให้ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ และกำจัดขยะ
ที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังไม่ให้ยุงวางไข่ได้



กำจัด

เหตุผลดี ๆ ที่ ยางรถยนต์เก่า ไม่ควรมืออยู่ในบ้าน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย
และเป็นพาหะนำโรค



โรคไข้เลือดออก

โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา



ปล่อย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กินลูกน้ำยุงลาย

อ่างบัว อ่างไม้ น้ำ ปล่อยทิ้งไว้ ยุงลาย อาจ มาวางไข่ได้
ป้องกันด้วยการปล่อยปลา กินลูกน้ำยุงลาย เช่น
ปลาหางนกยูง ปลากัด หรือ ปลาสอด



รู้ทัน โรคแมลง



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ตักออก

ทุก 7 วัน

โอ่งน้ำ หรือภาชนะน้ำใช้ในบ้าน
ใช้กระชอนตักลูกน้ำทิ้ง
เพื่อป้องกันการเกิดยุงลาย
และป้องกันโรคที่มียุงลาย
เป็นพาหะนำโรค

รู้ทัน โรคแมลง



มาแยกขยะกันเถอะ

ป้องกันยุงลายวางไข่

'ยุงลาย' เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ยุงลายมักวางไข่ตามแหล่งน้ำขังใส และหนึ่งในนั้นอาจมาจากขยะที่สามารถขังน้ำได้ เมื่อมีฝนตกอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย หากเราไม่คัดแยกก่อนทิ้งให้ดี



แก้วน้ำ



ขวดน้ำดื่ม



กล่องโฟม



กะลามะพร้าว
ไม้ใบกาบที่ขังน้ำ
ได้

“เมื่อกินเสร็จแล้ว เก็บเศษภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้และคัดแยกทิ้งขยะใส่ถุงดำก่อนนำไปทิ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ของยุงลาย”





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เต่า ก่อน เกิด

อย่าปล่อยให้ลูกน้ำกลายเป็นยุง
หมั่นสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื่อไวรัสซิกา

รู้ทันโรคแมลง


เข้าฤดูฝน

ระวังแหล่งวางไข่ยุงลาย

แหล่งวางไข่ยุงลาย สามารถเกิดขึ้นได้จากภาชนะที่มีน้ำขัง ไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หากปล่อยทิ้งไว้ อาจทำให้ยุงลายมาวางไข่ได้



จานรอง
กระถางต้นไม้



แจกัน




ถังน้ำใช้



โอ่งน้ำ



อ่างบัว



พืชใบกาบ



เศษภาชนะ



ถังขยะ



ยางรถยนต์เก่า



หมั่นสำรวจและเทน้ำทิ้งทุก 7 วัน ช่วยลดการเกิดของยุงลาย และลดการป่วยจากโรคติดต่อมาโดยยุงลาย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

7 วัน อันตราย ใช้เลือดออก

เมื่อยุงลายวางไข่ในแหล่งน้ำขัง จะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ในการฟักตัวเป็นลูกน้ำ เป็นตัวโม่ง และโตเป็นยุงลายตัวเต็มวัย ดังนั้นหากเราไม่ตัดวงจรชีวิตของยุงลาย ด้วยการสำรวจและกำจัด ลูกน้ำยุงลาย ทุกสัปดาห์ จะทำให้โรคไข้เลือดออกแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

รู้ทันโรคแมลง

24 ส.ค. 2566

กองโรคติดต่อมาโดยแมลง กรมควบคุมโรค