

**สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนาม และกัมพูชา**

๑. สปป.ลาว

๑.๑ กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว และองค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์ใน สปป.ลาว สรุป ดังนี้

(๑) โรคไข้เลือดออกระบาดอย่างรุนแรงครั้งสุดท้ายเมื่อปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ติดเชื้อ ๔๔,๒๕๐ คน และมีผู้เสียชีวิต ๑๙ คน หลังจากนั้น แม้จะลดความรุนแรงลง แต่โรคดังกล่าวยังคงแพร่ระบาดใน สปป.ลาว อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี ๒๕๖๑ มีผู้ติดเชื้อ ๖,๔๔๖ คน และเสียชีวิต ๑๙ คน อนึ่ง ศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ร่วมกับองค์การอนามัยโลกได้จัดทำคู่มือการบริหารโรคไข้เลือดออก สำหรับบุคลากรทางการแพทย์^๑ และแผ่นพับให้ความรู้ในกรณีการตรวจพบโรคดังกล่าวแล้ว

(๒) เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลก (WHO Dengue Situation Update Number ๕๗๒) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ ๒๕ ของปี ๒๕๖๒ (๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) มีผู้ติดเชื้อแล้ว ๘,๐๔๒ คน ซึ่งเพิ่มจากสัปดาห์ที่ ๒๔ (๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) ๒๐๕ คน และเสียชีวิตแล้ว ๒๒ คน ในภาพรวม จำนวนผู้ติดเชื้อมีค่าสูงกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของช่วงเวลา ๕ ปี ที่ผ่านมา และเป็นการระบาดในระดับประเทศซึ่งมีแนวโน้มเดียวกับการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๖

๑.๒ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายบุนกอง สีหาว รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สปป.ลาว ว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออกใน สปป.ลาว แล้ว ๑๑,๙๒๘ คน และเสียชีวิตแล้ว ๒๗ คน โดยแบ่งตามพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบที่สุดตามลำดับ ดังนี้ ลำดับที่ ๑ แขวงสะหวันนะเขต ติดเชื้อ ๑,๙๗๕ คน เสียชีวิต ๑๐ คน ลำดับที่ ๒ นครหลวงเวียงจันทน์ ติดเชื้อ ๒,๒๑๔ คน เสียชีวิต ๖ คน ลำดับที่ ๓ แขวงจำปาสัก ติดเชื้อ ๒,๔๙๐ คน เสียชีวิต ๕ คน ลำดับที่ ๔ แขวงสาละวัน ติดเชื้อ ๑,๕๐๗ คน เสียชีวิต ๓ คน ลำดับที่ ๕ แขวงคำม่วน ติดเชื้อ ๑,๒๒๘ คน เสียชีวิต ๒ คน ลำดับที่ ๖ แขวงอัตตะปือ ติดเชื้อ ๗๗๐ คน ลำดับที่ ๗ แขวงบอลิคำไซ ติดเชื้อ ๔๘๖ คน ลำดับที่ ๘ แขวงหลวงน้ำทา ติดเชื้อ ๓๔๗ คน ลำดับที่ ๙ แขวงเวียงจันทน์ ติดเชื้อ ๓๒๖ คน ลำดับที่ ๑๐ แขวงเซกอง ติดเชื้อ ๒๑๒ คน ลำดับที่ ๑๑ แขวงไซยะบูลี ติดเชื้อ ๑๙๘ คน นอกจากนี้ ยังมีรายงานการระบาดตามแขวงอื่น ๆ ทุกแขวงยกเว้นแขวงหัวพันและแขวงพงสาลี

๑.๓ รัฐบาล สปป.ลาว ประกาศเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเอง บนหลักการ ๕ ป. (ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ) เพื่อป้องกันและทำลายแหล่งแพร่ระบาดของยุงลาย และให้วัดและโรงเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการดำเนินการดังกล่าว

๒. เวียดนาม

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลก (WHO Dengue Situation Update Number ๕๗๒) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ ๒๕ ของปี ๒๕๖๒ (๑๖ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) มีรายงานผู้ติดเชื้อแล้ว ๘๑,๑๓๒ คน (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ ๒๐.๒) และเสียชีวิต ๔ คน ในพื้นที่ ๕๐ จังหวัดของ ๖๓ จังหวัดของทั้งประเทศ ทั้งนี้ ในภาพรวม มีการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น ๓.๑ เท่า จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ปรากฏกระแสข่าวไข้เลือดออกระบาดในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยเฉพาะที่นครโฮจิมินห์และจังหวัดในภาคใต้ของเวียดนามซึ่งนับว่าเป็นการระบาดนอกฤดูกาลปกติ ที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามได้จัดตั้งระบบติดตามและพยากรณ์การระบาดของไข้เลือดออกซึ่งใช้ข้อมูลจากดาวเทียมควบคู่กับการพยากรณ์อากาศเพื่อระบุพื้นที่เสี่ยงและสั่งการให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเข้มงวดเรื่องการจัดพาหะ

^๑ http://www.ncle.gov.la/wp-content/uploads/๒๐๑๘/๐๖/DENGUE-GUIDELINE-๒๐๑๐_๒๐๑๓.pdf

๓. กัมพูชา

๓.๑ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลก (WHO Dengue Situation Update Number ๕๗๒) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์ที่ ๒๕ ของปี ๒๕๖๒ (๑๖ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) มีผู้ที่คาดว่าติดเชื้อประมาณ ๔,๐๓๒ คน ทั้งนี้ นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๒ ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ ในห้วง ๕ สัปดาห์ที่ผ่านมา

๓.๒ ในปี ๒๕๖๒ โรคไข้เลือดออกได้เริ่มแพร่ระบาดในกัมพูชาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยปัจจุบัน มีรายงานผู้ติดเชื้อกว่า ๑๕,๐๐๐ คน และเสียชีวิต ๒๕ คน และเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้ออกประกาศกำหนดมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกไปยังสถานพยาบาล และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกและจัดหน่วยเคลื่อนที่ของสาธารณสุขจังหวัดต่าง ๆ นีดยาม่ายงลายตามชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลาย

* * * * *

กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒
กรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรกฎาคม ๒๕๖๒